

Критерии ранней выписки из стационара для продолжения лечения в условиях «Стационара на дому»
(исключение составляют пациенты с тяжелым и критическим течением)

Критерии	Характеристика
Клинические критерии	отсутствие повышенной температуры тела >3 дней, регрессия респираторных симптомов
Инструментальные критерии	-на момент выписки объем поражения легких на КТ менее 50% (при наличии) -отсутствие прогрессирования инфильтрации по результатам визуализации легких (КТ/рентген) - ЭКГ- отсутствие признаков острых нарушений ритма и острого повреждения миокарда.
Лабораторные критерии	отсутствие прогрессирования маркеров воспаления и коагулопатии (лимфопения; тромбоцитопения; повышение: СРБ, Д-димера, прокальцитонина, фибриногена), отсутствие повышение тропонина.
ПЦР - диагностика	Однократно отрицательный результат ПЦР мазка из носоглотки (контрольный ПЦР мазка из носоглотки назначается при наличии клиничко - инструментальных критериев улучшения). - при положительном результате контрольного ПЦР-тестирования и при наличии клиничко - инструментальных критериев улучшения пациент может продолжать лечение в домашних условиях
Рекомендации	- Пациенту необходимы условия для изоляции (по возможности отдельная комната) - Должен соблюдаться принцип преемственности в лечении согласно представленной выписке

