



ОТВЕТЫ

НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ПО ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ

ПРЕПАРАТОМ PFIZER



ПОЧЕМУ СОБИРАЮТСЯ ДЕТЕЙ ВАКЦИНИРОВАТЬ В ШКОЛАХ?

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАКЦИНАЦИЯ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЬНЫХ МЕДПУНКТАХ:

- благополучное здоровое окружение
- восприятие факта медпроцедуры облегчается в привычной среде
- родителям нет нужды пропускать работу
- обеспечение детей питанием, во избежание вакцинации на голодный желудок
- наличие психолога и общение с ним в привычной обстановке
- допускается вакцинация в поликлиниках в индивидуальном порядке



НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНА ВАКЦИНА PFIZER?

- Имеет временную госрегистрацию в РК
- Включена в список ВОЗ, рекомендованный для применения в чрезвычайных ситуациях

Высокая эффективность и безопасность для детей до 18 лет, согласно 3-й фазе клинических исследований на подростках



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ

ПРЕПАРАТОМ PFIZER



КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ОСЛОЖНЕНИЯ У РЕБЕНКА?

**У НЕКОТОРЫХ ПРИВИВАЕМЫХ ВАКЦИНА МОЖЕТ
ВЫЗЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕАКЦИИ:**

- >10%: боль, припухлость в месте инъекции, утомляемость, головная и мышечная боль, боль в суставах, озноб, диарея, лихорадка, покраснение в месте инъекции, тошнота, рвота
- >1%: увеличение лимфоузлов, недомогание, боль в руке, бессонница, зуд в месте инъекции
- >0,1%: аллергические реакции, такие как сыпь, крапивница

МОЖЕТ ЛИ РОДИТЕЛЬ ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРИ ВАКЦИНАЦИИ РЕБЕНКА? КАК БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬСЯ, ИМЕЕТСЯ ЛИ СОГЛАСИЕ?

- Любая профилактическая прививка, включая прививку против КВИ, проводится только с информированного согласия родителей на вакцинацию
- На прививку приглашаются по заранее составленному списку только тех, у кого есть подписанное родителем согласие на вакцинацию

НЕ СНИЖАЮТ ЛИ ВАКЦИНЫ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ?

- Вакцины не снижают естественный иммунитет. Нет ни одного исследования, которое доказывает влияние вакцинации на врожденный иммунитет



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ

ПРЕПАРАТОМ PFIZER



МОГУ ЛИ Я ПОСТАВИТЬ МОЕМУ РЕБЕНКУ НЕ ПФАЙЗЕР, А ДРУГУЮ ВАКЦИНУ?



- На сегодня в нашей стране вакцинацию подросткам в возрасте 12-17 лет будет проводиться вакциной «Пфайзер», которая одобрена ВОЗ и является единственной вакциной, рекомендованной для вакцинации подростков старше 12 лет и беременных
- Проведение вакцинации указанных контингентов в республике основано на опыте других стран (США, Германии, Великобритании, Израиле и Бельгии, Индия, ОАЭ) в которых рекомендована вакцинация детей старше 12 лет



ДЕТСКИЙ ПАСПОРТ ВАКЦИНАЦИИ - ГДЕ ЕГО СКАЧАТЬ? КАК ПОЛУЧИТЬ БУМАЖНУЮ ВЕРСИЮ?



- Электронный паспорт вакцинации можно скачать в мобильном приложении «eGov mobile»
- Бумажную справку о вакцинации с QR-кодом Вы можете получить в поликлинике по месту проживания

ЧТО ДОЛЖНЫ РОДИТЕЛИ ПРЕДПРИНЯТЬ ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ РЕБЕНКА?

- Перед проведением вакцинации подростку проводится медосмотр с измерением артериального давления, сатурации, температуры, осмотра кожных покровов и видимых слизистых и оценивается общее состояние
- При выявлении жалоб и клинических показаний подросток направляется на дополнительные лабораторно-инструментальные исследования.
- По показаниям подросток может быть направлен на консультацию узких специалистов



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ

ПРЕПАРАТОМ PFIZER



КАК БУДУТ НАБЛЮДАТЬ ЗА РЕБЕНКОМ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ?

Медицинское наблюдение проводится в первые 30 минут после введения вакцины и в течение последующих 3 дней путем обзвона родителей или законных представителей привитых подростков

ЗАЩИЩАЕТ ЛИ ВАКЦИНА БЦЖ, СДЕЛАННАЯ ДЕТЯМ, ОТ КОРОНАВИРУСА?

Вакцина БЦЖ не может защитить от коронавирусной инфекции, она защищает от тяжелых форм туберкулеза



ДЕЛАТЬ ЛИ ВАКЦИНАЦИЮ, ЕСЛИ У РЕБЕНКА ДОСТАТОЧНО СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ?

Вакцина против КВИ дает привитому специфический иммунитет, который защищает от коронавирусной инфекции
Естественный неспецифический иммунитет не всегда сможет противостоять инфекциям, вследствие чего при инфицировании непривитых есть высокий риск заболевания и развития осложнений



НЕ ПЕРЕГРУЖАЕТ ЛИ ВАКЦИНА ИММУННУЮ СИСТЕМУ?

Антигены, содержащиеся в дозе вакцины, никоим образом не могут перегружать организм и направлены на выработку специфической иммунной защиты против КВИ



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ

ПРЕПАРАТОМ PFIZER



МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ВАКЦИНУ НЕ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИЮ, А ПЕРОРАЛЬНО?

В соответствии с инструкцией производителя вакцина «Комирнати» вводится внутримышечно



ПРАВДА ЛИ, ЧТО РЕБЕНОК МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ БОЛЕЗНЮ, ОТ КОТОРОЙ ЕМУ СТАВЯТ ВАКЦИНУ?

В составе вакцины против КВИ нет цельного живого вируса, поэтому введенная вакцина не может вызвать заболевание КВИ. В вакцине есть лишь частичка коронавируса, к которому вырабатываются антитела



МОЖЕТ ЛИ ВАКЦИНА ПФАЙЗЕР ПРИВЕСТИ В РАКУ ИЛИ ДИАБЕТУ? ВЫЗЫВАЕТ ЛИ ВАКЦИНА АУТИЗМ?

Вакцина «Комирнати» не приводит к раку, диабету и аутизму. Более того, вакцинация необходима для лиц, которые имеют хронические заболевания. При этом, вакцинация проводится в периоде вне обострения заболевания



ЕСТЬ ЛИ В ВАКЦИНАХ ДОБАВКИ? ЕСТЬ ЛИ В НИХ КОНСЕРВАНТЫ?

В вакцинах отсутствуют компоненты, приводящие к отдаленным нежелательным последствиям как бесплодие или мутационные процессы в организме. Любые вещества в вакцинах содержатся в безопасных для организма концентрациях в соответствии с международными нормативами



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ

ПРЕПАРАТОМ PFIZER



КУДА МОЖНО БУДЕТ ОБРАТИТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ?

В медицинскую организацию, которую проводила вакцинацию, либо в управление здравоохранения соответствующей территории. В инструкции вакцины также указан адрес организаций по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственных средств



РЯД СТРАН ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ. ПОЧЕМУ МЫ ЕЕ ДЕЛАЕМ?

Многие развитые страны, такие как Израиль, Франция, Италия, Испания, Германия, Бразилия, Китай, Швеция, Великобритания, США, Аргентина и др. уже начали кампанию по вакцинации детей



КАК Я МОГУ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВАКЦИНАЦИИ РЕБЕНКА?

Перед проведением профилактической прививки медицинский сотрудник предоставляет форму информированного согласия на проведение прививок граждан, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних. Добровольное информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок оформляется в письменном виде



К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ОТКАЗ РОДИТЕЛЕЙ ОТ ВАКЦИНАЦИИ РЕБЕНКА?

Родитель лишает своего ребенка права на охрану здоровья, гарантированного Конституцией Республики Казахстан (ст. 29), определенного Конвенцией о правах ребенка ООН и законом «О правах ребенка в РК» и подвергает его риску заболевания КВИ у детей



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ

ПРЕПАРАТОМ PFIZER



ГДЕ КРОМЕ ШКОЛ МОЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬ?

Вакцинация подростков старше 12 лет будет проводиться в прививочных пунктах организаций образования, а также по желанию родителей допускается проведение вакцинации в поликлинике в индивидуальном порядке



НУЖНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ?

Направление получать необязательно. Можно записаться на вакцинацию через портал «Еgov» или по телефону медицинской организации по месту жительства



МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЕТЕЙ ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ?

Перед вакцинацией проводится медосмотр прививаемого лица и при отсутствии противопоказаний к иммунизации оформляет допуск к проведению прививки в медицинском документе прививаемого



ВАКЦИНАЦИЯ В УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД?

Вакцинация начинается в текущем месяце в зависимости от поступления вакцины в регион. Подростки, получившие прививку, в течение 30 минут после вакцинации находятся под медицинским наблюдением. После этого, привитые могут вернуться к занятиям, также при необходимости быть освобождены от уроков



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ

ПРЕПАРАТОМ PFIZER



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПО ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ, СНАЧАЛА 12-13 ЛЕТ, ЗАТЕМ 14-15 ИЛИ КАК?



Вакцинация подростков начнется со старшей возрастной категории подростков, то есть с подростков в возрасте 16-17 лет. Далее, будут вовлекаться подростки других возрастных групп, то есть 15,14,13 и 12 лет

ТЕМ ПОДРОСТКАМ, КОТОРЫЕ НА ПЕРЕХОДЕ МЕЖДУ 17-18 ЛЕТ, КАК БЫТЬ?

Если на момент получения вакцинации возраст подростка не достиг 18 лет, то подросток прививается вакциной Пфайзер, и курс вакцинации может быть завершен уже по достижении 18-летнего возраста



ЕСЛИ РЕБЕНОК СОСТОИТ НА КАКОМ- ЛИБО МЕДИЦИНСКОМ УЧЕТЕ, ПОДЛЕЖИТ ЛИ ОН ВАКЦИНАЦИИ?

В этом случае на вакцинацию допускаются после получения консультации и допуска от лечащего врача. При наличии хронических заболеваний, вакцинация будет проводиться в периоде ремиссии

