

ВАКЦИНА БЦЖ

- это действенный способ уберечь детей от туберкулеза, а в случае заражения – значительно снизить риск его осложнений. Проводится на 1-4 день после рождения ребенка.

Повторная вакцинация (ревакцинация) проводится детям в возрасте от 6 до 7 лет при отрицательной реакции Манту для поддержания приобретенного иммунитета.

Нормальная реакция на вакцину БЦЖ

РЕАКЦИЯ НА ПРИВИВКУ
ПРОХОДИТ В НЕСКОЛЬКО
ЭТАПОВ:

ПОКРАСНЕНИЕ

ЗАЖИВЛЕНИЕ

КОРОЧКА

РУБЧИК



ОБЫЧНО ЭТОТ ПРОЦЕСС
ЗАНИМАЕТ 2-3 МЕСЯЦА, НО
ИНОГДА И БОЛЕЕ
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК.

У 90-95% ПРИВИТЫХ НА МЕСТЕ
ВАКЦИНЫ ОБРАЗУЕТСЯ
ПОВЕРХНОСТНЫЙ РУБЧИК
ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ.

РЕДКО НА МЕСТЕ ВВЕДЕНИЯ
БЦЖ ОБРАЗУЕТСЯ
АПИГМЕНТНОЕ ПЯТНО.


ВАЖНО ЗНАТЬ:

1. Место реакции следует оберегать от механического раздражения, особенно во время водных процедур (нельзя тереть губкой)

2. В первые три месяца не ставить другие прививки в ту же руку, чтобы не спровоцировать лимфаденит.

3. Не следует накладывать повязку, пластырь. Нежелательно одевать ребенка в тесную одежду, чтобы не натирать кожу.

4. Проверять реакцию на БЦЖ через 1,3,6,12 месяцев после вакцинации у педиатра. В случае каких либо сомнительных реакции на прививку обращаться за консультацией к фтизиатру, чтобы избежать осложнений или минимизировать их последствия.



БЦЖ ЕКПЕСІ

- балаларды туберкулезден сақтаудың тиімді әдісі, ал ауру жұқтырған жағдайда оның асқыну қаупін едәуір азайтады. Бала туылғаннан кейін 1-4 күні ішінде салынады.

Қайта вакциналау (ревакциналау) 6 жастан 7 жасқа дейінгі балаларға жүре пайда болған иммунитетті сақтау үшін Мантуға реакция теріс болған жағдайда салынады.

БЦЖ екпесіне қалыпты реакция

ЕКПЕГЕ РЕАКЦИЯ БІРНЕШЕ
КЕЗЕҢНЕН ЖҮРЕДІ:

ҚЫЗАРУ

ЖАЗЫЛУ

ҚАБЫРШЫҚТАНУ

ТЫРТЫҚ

ӘДЕТТЕ БҰЛ ПРОЦЕСС 2-3 АЙҒА СОЗЫЛАДЫ, БІРАҚ КЕЙДЕ ОДАН ДА ҰЗАҚ БОЛУЫ МҮМКІН. ЕКПЕ САЛҒАНДАРДЫҢ 90-95% - ҢДА ЕКПЕ ОРНЫНДА ДИАМЕТРІ 10 ММ-ГЕ ДЕЙІН ТЫРТЫҚ ПАЙДА БОЛАДЫ. БЦЖ САЛҒАН ОРНЫНДА ПИГМЕНТТІ ДАҚ СІРЕК ПАЙДА БОЛАДЫ.



МАҢЫЗДЫ:

1. Реакция берген жерді механикалық тітіркенуден қорғау керек, әсіресе су процедуралары кезінде ысқышпен сүртуге болмайды)

2. Алғашқы үш айда лимфаденит тудырмас үшін бұл қолға басқа екпелерді салуға болмайды.

3. Таңғыш, жапсырма қолдануға болмайды. Теріні қажамау үшін балаға тар киім киізбеген жөн.

4. Вакциналаудан кейін 1, 3, 6, 12 айдан кейін педиатрға БЦЖ реакциясын тексерту керек. Екпеге қандай да бір күдікті реакциялар болған жағдайда асқынуларды болдырмау немесе олардың салдарын азайту үшін фтизиатрдың кеңесіне жүгіну қажет.

