



## ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ПРОБЕ МАНТУ

**Проба Манту** – это внутрикожное введение туберкулина с целью выявления туберкулёза. Это важный метод, потому что позволяет определить туберкулёз на ранних этапах.



### Виды реакции на пробу:



- 1. Отрицательная реакция** при полном отсутствии папулы
- 2. Сомнительная реакция** при наличии гиперемии без папулы 2-4 мм
- 3. Положительная реакция** При наличии папулы размером 5 и > мм
- 4. Гиперергическая реакция** при наличии папулы > 15 мм или везикулонекротических изменениях

правильный замер инфильтрата (папулы)



Именно диаметр этой папулы имеет решающее значение. Ее измеряют прозрачной линейкой, перпендикулярно длине руки. От края до края. Размер записывают в миллиметрах.


неправильный замер инфильтрата (папулы)



Если вокруг папулы имеется покраснение (гиперемия), ее диаметр измеряют отдельно.

Противопоказаниями к проведению туберкулиновой пробы являются:

**Аллергические состояния**



**Кожные заболевания**

**Эпилепсия**



**Острые и хронические инфекционные и соматические заболевания в стадии обострения**

### ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ

1. Мочить место инъекции
2. Купать ребенка



1. Расчесывать
2. Чем-либо обрабатывать
3. Использовать вехотку (мочалку) в месте инъекции при купании

### НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Употреблять в течении 3-х дней после пробы продукты и напитки, на которые прежде у ребенка была **аллергия**.

## МАНТУ СЫНАМАСЫ ТУРАЛЫ НЕ БІЛУҢІЗ КЕРЕК

**Манту сынамаcы** – туберкулезді анықтау мақсатында туберкулинді терішіне енгізу. Бұл маңызды әдіс, себебі ол туберкулезді ерте кезеңде анықтауға мүмкіндік береді.



### Сынамаға реакция түрлері :



1. **Теріс реакция** түйіншек толық болмаған жағдайда
2. **Күдікті реакция** 2-4 мм түйіншексіз гиперемия болған жағдайда
3. **Оң реакция** 5 және > мм көлемінде түйіншек болған жағдайда
4. **Гиперергиялық реакция** > 15 мм түйіншек немесе везикулонекротикалық өзгерістер болған жағдайда

Инfiltrатты (папула) дұрыс өлшеу



Дәл осы түйіншектің диаметрі өте маңызды. Оны қолдың ұзындығына қарай тігінентүссіз сызғышпен өлшейді. Шетінен шетіне дейін. Өлшемі миллиметрмен жазылады.

Инfiltrатты (папула) дұрыс емес өлшеу



Егер түйіншектің айналасы қызарса (гиперемия), оның диаметрі бөлек өлшенеді.

### Туберкулин сынамаcын жүргізуге қарсы көрсетілімдер:

**Аллергиялық жағдайы**



**Тері аурулары**

**Эпилепсия**



**Жедел және созылмалы асқынып бара жатқан жұқпалы және соматикалық аурулар**

### НЕ БОЛАДЫ ЖӘНЕ БОЛМАЙДЫ

1. Ине салған жерге су тигізуге
2. Баланы шомылдыруға

1. Қасуға
2. Бір нәрсемен сүртіп тазалауға
3. Шомылған кезде ине салған жерді жөкемен жууға

### Ұсынылмайды

Сынама салғаннан кейін 3 күн ішінде балаға бұрын **аллергия** берген тағамдар мен сусындарды ішу.